

# 定期予防接種のご案内

※予防接種を受けに行く前に、必ず「**予防接種と子どもの健康**」の冊子を読みましょう。

対象疾病 (ワクチン)	標準的な接種時期		回数	対象年齢	
ロタウイルス感染症	経口弱毒生ヒトロタウイルス ワクチン (1価ワクチン) ロタリックス		2回	生後6週～24週未満	
	5価経口弱毒生ヒトロタウイ ルスワクチン (5価ワクチ ン) ロタテック		3回	生後6週～32週未満	
B型肝炎 (B型肝炎ワクチン)	初回	生後2～9月未 満	★1回目接種から27日以上の間隔で接種	1歳未満	
	追加		★1回目接種から139日以上の間隔を おいて接種		
Hib感染症※ (ヒブワクチン) 乾燥ヘモフィルスb型ワクチン	初回	生後2月～7月未満 ★27日～56日の間隔で接種	3回	生後2月～60月未満	
	追加	初回終了後7月～13月の間隔を おいて接種	1回		
小児の肺炎球菌感染症※ (小児用肺炎球菌ワクチン)	初回	生後2月～7月未満 ★27日以上の間隔で接種 ★生後24月までに完了	3回	生後2月～60月未満	
	追加	初回終了後60日以上の間隔を おいて生後12月に至った日以降に 接種	1回		
ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ Hib感染症 (5種混合)	1期初回	生後2月～12月未満 ★20日～56日の間隔で接種	3回	生後2月～90月未満	
	1期追加	1期初回終了後12月～18月の 間隔を おいて 接種	1回		
ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ (4種混合)	1期初回	生後2月～12月未満 ★20日～56日の間隔で接種	3回	生後2月～90月未満	
	1期追加	1期初回終了後12月～18月の 間隔を おいて 接種	1回		
結核 (BCGワクチン)	生後5月～8月未満		1回	1歳未満	
麻しん 風しん (MR)	1期	生後12月～24月未満	1回	左記のとおり	
	2期	小学校就学の1年前の日から その前日まで	1回		
水痘 (水痘ワクチン)	1回目	生後12月～15月未満	1回	生後12月～36月未満	
	2回目	初回終了後6月～12月の 間隔を おいて 接種	1回		
日本脳炎 (日本脳炎ワクチン)	1期	初回	3歳 ★6日～28日の間隔を おいて接種	2回	生後6月～90月未満
		追加	4歳 ★1期初回終了後概ね1年 おいて接種	1回	
	2期	9歳	1回	9歳～13歳未満	
ジフテリア・破傷風 (DT)	2期	11歳	1回	11歳～13歳未満	

## ☆予防接種を受ける際の注意事項

- ・すべて個別接種です。通年(4月～3月)で、次ページに記載の実施医療機関で接種できます。
  - ・接種料:無料 ただし、対象年齢以外の接種は、任意接種となり全額自己負担となります。
  - ・接種の際は、母子健康手帳、本紙「予防接種の予診票」を切り取って記入の上ご持参ください。
  - ・たつの市、太子町、姫路市、宍粟市、相生市、赤穂郡、佐用郡の実施医療機関以外で定期予防接種を希望される場合は、事前に「広域的予防接種」の申請が必要ですので、健康課(はつらつセンター内)または各保健センターにお越しください。
- ※Hib感染症及び小児科の肺炎球菌感染症については、接種開始月齢により接種回数が変わります。詳しくは「予防接種と子どもの健康」P18～19、P21をご覧ください。