

定期予防接種の種類と接種時期

対象疾病（ワクチン）	標準的な接種時期		回数	対象者	
RS ウイルス感染症 (RS ウイルスワクチン)	—		1回	妊娠 28 週 0 日から 妊娠 36 週 6 日までの 妊婦	
ロタウイルス 感染症	経口弱毒生 ヒトロタウイルスワ クチン (1 価ワクチン) (ロタリックス)	接種開始は生後 2 月～出生 14 週 6 日 まで ★27 日以上の間隔をおいて接種 ★経口接種	2回	出生 6 週～24 週未満	
	5 価経口弱毒生 ロタウイルス ワクチン (5 価ワクチン) (ロタテック)		3回	出生 6 週～32 週未満	
B 型肝炎 (B 型肝炎ワクチン)	初回	生後 2～ 9 月未満	★1 回目接種から 27 日以上の間隔で 接種	2回	1 歳未満
	追加		★1 回目接種から 139 日以上の間隔を おいて接種		
※ 小児の肺炎球菌感染症 (小児用肺炎球菌ワクチン)	初回	生後 2 月～7 月未満 ★27 日以上の間隔で接種 ★生後 24 月までに完了	3回	生後 2 月～60 月未満	
	追加	初回終了後 60 日以上の間隔をおいて 生後 12 月に至った日以降に接種	1回		
ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ Hib 感染症 (DPT-IPV-Hib)	第 1 期初回	生後 2 月～7 月未満 ★20 日～56 日の間隔で接種	3回	生後 2 月～90 月未満	
	第 1 期追加	第 1 期初回終了後 6 月～18 月の間隔を おいて接種	1回		
結核（BCG ワクチン）	生後 5 月～8 月未満		1回	1 歳未満	
麻しん・風しん混合 (MR)	第 1 期	生後 12 月～24 月未満	1回	左記のとおり	
	第 2 期	小学校就学の 1 年前の日からその前日 まで	1回		
水痘 (水痘ワクチン)	1 回目	生後 12 月～15 月未満	1回	生後 12 月～36 月未満	
	2 回目	1 回目接種終了後 6 月～12 月の間隔を おいて接種	1回		
日本脳炎 (日本脳炎ワクチン)	第 1 期	初回	3 歳 ★6 日～28 日の間隔をおいて接種	2回	生後 6 月～90 月未満
		追加	4 歳 ★第 1 期初回終了後概ね 1 年おいて接 種	1回	
	第 2 期	9 歳	1回	9 歳～13 歳未満	
ジフテリア・破傷風 (DT)	第 2 期	11 歳	1回	11 歳～13 歳未満	
ヒトパピローマウイルス 感染症 (HPV ワクチン)	12 歳となる日の属する年度の初日から 16 歳となる日の属する年度の末尾までの間にある女子		3回	小学校 6 年生から高校 1 年生相当の女子	